







PRUEBAS FUNCIONALES PARA LA EXPLORACIÓN PREVENTIVA DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES

Epicondilitis	(+) Dolor a la palpación y a la extensión contra resistencia muñeca.	Maniobra Phalen	Normal: no parestesia (+): posible afectación túnel carpal
<p>1- Se produce dolor en Epicóndilo a la palpación.</p> <p>2- Se le pide al paciente extensión contra resistencia de la muñeca: aparece dolor.</p>		<p><u>Valora estado Túnel carpal y N. Mediano.</u> Al sostener la posición 1 min, aparece parestesia en el territorio del N. Mediano</p> <p>Phalen Invertido (manos en posición de rezo): se valora igual.</p>	

Maniobra Finkelstein	(+) Dolor a desviación cubital con pulgar dentro del puño	Epitrocleítis	(+) dolor a la palpación en Epitroclea y con la flexión resistida de la muñeca.
<p><u>Valora Tendinitis De Quervain:</u></p> <p>Al realizar desviación cubital con el pulgar dentro de la mano y el puño cerrado, aparece dolor en los tendones de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EC Pulgar - Abd Largo Pulgar. 		<p>1- Aparece dolor a la presión en Epitroclea.</p> <p>2- Se le pide al paciente que realice flexión contra resistencia de la muñeca: aparece dolor.</p>	

Test de Jobe	(+) aparece dolor que limita el movim (-) no hay limitación en movim.	Test de Patte	(+) aparece dolor que limita el movim (-) no hay limitación en movim.
<p><u>Valora el estado del Supraespinoso:</u> Se pone el Pulgar hacia abajo y el codo extendido. Se le pide al paciente que realice la Abd del hombro contra resistencia</p>		<p><u>Valora el estado del Infraespinoso:</u> Se coloca el Hombro en Abd y antepulsión. Se pide al paciente que realice Rot Ext contra resistencia</p>	

PRUEBAS FUNCIONALES PARA LA EXPLORACIÓN PREVENTIVA DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES

Test de Gerber	(+) aparece dolor que limita el movim (-) no hay limitación en movim.	Palm up test	(+) aparece dolor que limita el movim (-) no hay limitación en movim.
<p><u>Valora el estado del Subescapular:</u> Se le pide que realice una separación de la mano desde lumbares contra resistencia, en rotación interna.</p>		<p><u>Tendón Bíceps Largo:</u> Se coloca el codo Ext y en Supinación. Se le pide al paciente que eleve el brazo contra resistencia. Aparece pérdida de fuerza y dolor.</p>	